

# 安全性速報

## 抗リウマチ剤

### ケアラム<sup>®</sup>錠 25mg/コルベット<sup>®</sup>錠 25mg(イグラチモド)と ワルファリンとの相互作用が疑われる重篤な出血について

今般、イグラチモド（ケアラム錠及びコルベット錠、以下「本剤」）とワルファリンとの相互作用が疑われる肺胞出血による死亡例が報告されました。

2012年9月12日の販売開始から2013年5月17日までの間に、本剤とワルファリンとの相互作用が疑われる出血又は血液凝固能検査値の異常変動（PT-INR 増加）が9例〔うち、重篤3例（上記死亡例を含む）〕報告されています（販売開始以降の使用患者数2660人）。そのうち、専門家の評価により本剤とワルファリンの相互作用の可能性が否定できないとされた症例は6例〔うち、重篤3例（上記死亡例を含む）〕とされています。

このような状況を考慮し、本剤とワルファリンとの併用を「禁忌」とすることにいたしました。

本剤の使用にあたっては、以下の事項に十分ご注意ください。

1. 現在ワルファリンを併用している患者については、本剤の服用中止を検討してください。
2. ワルファリンの治療を必要とする患者には、本剤を投与しないでください。

使用上の注意の「禁忌」「相互作用（併用禁忌）」の項を改訂しましたので、あわせてご連絡いたします。

お問い合わせ先につきましては4頁をご参照ください。

■本剤とワルファリン併用例で出血又は血液凝固能検査値の異常変動が認められた症例

| 症例 | 性別 | 年齢   | 副作用名                        | 重篤性 | 1日投与量 | 発現までの日数                  | 本剤の処置 | 転帰                   |
|----|----|------|-----------------------------|-----|-------|--------------------------|-------|----------------------|
| 1  | 女  | 70歳代 | PT-INR 増加<br>肺胞出血           | 重篤  | 50mg  | 12日<br>41日               | 中止    | 回復<br>死亡             |
| 2  | 女  | 60歳代 | 便潜血陽性<br>歯肉出血<br>皮下出血<br>貧血 | 重篤  | 25mg  | 23日<br>12日<br>14日<br>23日 | 中止    | 不明<br>回復<br>回復<br>回復 |
| 3  | 男  | 80歳代 | 穿刺部位出血<br>結膜出血              | 重篤  | 25mg  | 29日<br>29日               | 中止    | 回復<br>回復             |
| 4  | 女  | 70歳代 | PT-INR 増加                   | 非重篤 | 25mg  | 28日                      | 中止    | 不明                   |
| 5  | 女  | 70歳代 | PT-INR 増加                   | 非重篤 | 25mg  | 28日                      | 継続    | 回復                   |
| 6  | 女  | 60歳代 | PT-INR 増加                   | 非重篤 | 25mg  | 不明                       | 不明    | 不明                   |
| 7  | 女  | 50歳代 | PT-INR 増加                   | 非重篤 | 25mg  | 14日                      | 継続    | 回復                   |
| 8  | 女  | 60歳代 | 皮下出血                        | 非重篤 | 50mg  | 109日                     | 中止    | 回復                   |
| 9  | 男  | 60歳代 | 血腫                          | 非重篤 | 25mg  | 15日                      | 中止    | 回復                   |

■症例概要

<症例1>

| 患者    |   | 1日投与量<br>投与期間                | 症状・経過及び処置              |  | 転帰       |
|-------|---|------------------------------|------------------------|--|----------|
| 性・年齢  | 使用理由<br>(合併症)   |                              |                        |  |          |
| 女・70代 | 関節リウマチ<br>(心房細動)<br>(間質性肺疾患)<br>(慢性気管支炎)<br>(不眠症)<br>(うつ病)<br>(骨粗鬆症)<br>(腎機能障害) | 25mg<br>31日間<br>50mg<br>10日間 | 副作用名：PT-INR 増加<br>肺胞出血 | <p>投与約16年前：<br/>投与約6年前：<br/>投与6日前：<br/>投与開始日：</p> <p>投与2日目：<br/>投与12日目：<br/>投与18日目：<br/>投与22日目：<br/>投与32日目：<br/>投与41日目：<br/>投与42日目：<br/>(投与中止日)</p> <p>中止1日後：<br/><br/>中止2日後：<br/>中止3日後：<br/><br/>中止3日後以降：<br/>中止13日後：</p> | 回復<br>死亡 |

併用薬：ワルファリンカリウム、サラゾスルファピリジン、プレドニゾロン、タクロリムス水和物、テブレノン、スリンダク、ゾルピデム酒石酸塩、リセドロン酸ナトリウム水和物

臨床検査値：

| 検査項目                      | 投与6日前 | 投与2日目 | 投与12日目 | 投与22日目 | 投与32日目 | 中止1日後 |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| PT-INR                    | 1.34  | 1.35  | 2.94   | 2.29   | 2.27   | 7.18  |
| RBC (10 <sup>4</sup> /μL) | 382   |       | 363    |        | 385    | 381   |
| Hb (g/dL)                 | 11.0  |       | 10.5   |        | 10.8   | 10.6  |

| 検査項目                      | 中止2日後 | 中止3日後 | 中止5日後 | 中止6日後 | 中止9日後 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PT-INR                    | 11.91 | 1.24  | 3.06  | 1.32  | 1.17  |
| RBC (10 <sup>4</sup> /μL) | 325   | 319   | 306   |       | 304   |
| Hb (g/dL)                 | 9.1   | 8.7   | 8.3   |       | 8.2   |

<症例 2>

| 患者    |  | 1日投与量<br>投与期間 | 症状・経過及び処置  |  | 転帰                   |
|-------|--|---------------|--|--|----------------------|
| 性・年齢  | 使用理由<br>(合併症)  |               |  |  |                      |
| 女・60代 | 関節リウマチ<br>(高血圧)<br>(骨粗鬆症)<br>(心房細動)<br>(狭心症)<br>(四肢静脈血栓症)<br>(脂肪肝)<br>(慢性胃炎) | 25mg<br>11日間  | 副作用名：便潜血陽性<br>歯肉出血<br>皮下出血<br>貧血   |  | 不明<br>回復<br>回復<br>回復 |
|       |  |               | 投与開始日：<br>投与11日目：<br>(投与中止日)<br>中止1日後：<br>中止3日後：<br>中止10日後：<br>中止11日後：<br>中止12日後：<br>中止13日後：<br>中止16日後：<br>中止17日後：<br>中止20日後：<br>中止34日後： | ワルファリン 3mg 服用開始。<br>本剤投与開始。<br>舌のピリピリ感出現、咽頭痛発症。<br>歯茎より出血。<br>両大腿部皮下出血 (+)。<br>右前腕・両大腿前面・右下腿・左殿部皮下出血 (++)。ワルファリン 3mg/日を2mg/日に減量。エタネルセプトを中止。<br>全身倦怠感で朝の起床困難。顔面蒼白、歯茎出血は止血。メトトレキサートを中止。<br>入院。Hb 8.2g/dL、RBC 242 万と著減。便潜血反応 (+)。ワルファリン中止。濃厚赤血球 (MAP) 400mL 輸血。<br>MAP 400mL 輸血。<br>MAP 400mL 輸血。午後、全身の皮下出血増悪・軽快のいずれもなく不変。倦怠感消失、食欲改善。<br>末血検査結果正常化。<br>全身の皮下出血消失。<br>全快により退院見込み。<br>その後、退院。 |                      |

併用薬：ワルファリンカリウム、プレドニゾロン、メトトレキサート、エタネルセプト（遺伝子組換え）、トリアムシノロンアセトニド、エカベトナトリウム水和物、フルスルチアミン塩酸塩、ファモチジン、フロセミド、エルデカルシトール、エルカトニン、沈降インフルエンザワクチン、ニトログリセリン、セレコキシブ、ミノドロン酸水和物

臨床検査値：

| 検査項目                      | 投与 36 日前 | 中止 2 日後 | 中止 12 日後 | 中止 13 日後 | 中止 14 日後 | 中止 17 日後 | 中止 32 日後 |
|---------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PT-INR                    | 3.89     |         | 3.23     |          | 1.16     |          |          |
| RBC (10 <sup>4</sup> /μL) | 362      | 396     | 242      | 284      |          | 411      | 426      |
| Hb (g/dL)                 | 12.7     | 13.4    | 8.2      | 9.4      |          | 13.7     | 14.6     |

<症例 3>

| 患者    |  | 1日投与量<br>投与期間 | 症状・経過及び処置   |   | 転帰       |
|-------|--|---------------|---|---|----------|
| 性・年齢  | 使用理由<br>(合併症)  |               |   |   |          |
| 男・80代 | 関節リウマチ<br>(心房細動)<br>(腎機能障害)<br>(末梢動脈閉塞性疾患)<br>(骨粗鬆症) | 25mg<br>28日間  | 副作用名：穿刺部位出血<br>結膜出血   |   | 回復<br>回復 |
|       |  |               | 投与開始日：<br>投与29日目：<br>(投与中止日)<br>中止1日後：<br>中止7日後：<br>中止28日後： | A クリニックでワルファリン処方。PT-INR 1.5~2.0 で安定していた。<br>B 整形外科にて本剤(25mg)投与開始。<br>A クリニックも定期受診。PT-INR 1.5<br>B 整形外科にて実施した注射部位からの出血が止まらず、患者が A クリニックを受診。注射穿刺部位からの出血の止血困難であり、PT-INR が 8.0 に上昇。その際、左目の結膜出血も確認。入院のうえ、ワルファリン休薬、本剤中止し、メナテトレノン(15mg)経口投与し、止血に至る。<br>事象回復し、A クリニック退院。PT-INR 1.8<br>ワルファリン 2mg を再開。<br>ワルファリン 2mg で継続。PT-INR1.7 と良好なコントロール。 |          |

併用薬：ワルファリンカリウム、プレドニゾロン、サルボグレラート塩酸塩、アセトアミノフェン、レバミピド、ジクロフェナクナトリウム、エタネルセプト、アルプロスタジル、フロセミド、スピロラクトン、アロプリノール、ファモチジン、葉酸、ミゾリビン

改訂内容（抜粋）

| 改 訂 後  | 改 訂 前   |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
|--|---|-----------|---------|---------------------|---|------|------|-----------|---------|--------------|------------|--|-------|------------|--|-----------|------------|--|--|------|-----------|---------|--------------|------|--|-------------------|---|------|-------|------|--|-----------|------|--|
| <p><b>【禁 忌】</b>(次の患者には投与しないこと)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>妊婦又は妊娠している可能性のある婦人<br/>〔動物実験（ラット）で、催奇形性、早期胎児死亡率の増加及び胎児の動脈管収縮が認められている。（「6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）〕</li> <li>重篤な肝障害のある患者<br/>〔副作用として肝機能障害があらわれることがあるので、肝障害を更に悪化させるおそれがある。〕</li> <li>消化性潰瘍のある患者<br/>〔副作用として消化性潰瘍があらわれることがあるので、消化性潰瘍を更に悪化させるおそれがある。〕</li> <li>本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</li> <li><u>ワルファリンを投与中の患者</u><br/>〔「3. 相互作用」の項参照〕</li> </ol>  | <p><b>【禁 忌】</b>(次の患者には投与しないこと)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>妊婦又は妊娠している可能性のある婦人<br/>〔動物実験（ラット）で、催奇形性、早期胎児死亡率の増加及び胎児の動脈管収縮が認められている。（「6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）〕</li> <li>重篤な肝障害のある患者<br/>〔副作用として肝機能障害があらわれることがあるので、肝障害を更に悪化させるおそれがある。〕</li> <li>消化性潰瘍のある患者<br/>〔副作用として消化性潰瘍があらわれることがあるので、消化性潰瘍を更に悪化させるおそれがある。〕</li> <li>本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</li> </ol> |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| <p>3. 相互作用</p> <p>(1)併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ワルファリン<br/>(ワーファリン等)</td> <td>本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強され、<u>重篤な出血をきたした症例が報告されている。患者がワルファリンの治療を必要とする場合は、ワルファリンの治療を優先し、本剤を投与しないこと。</u></td> <td>機序不明</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非ステロイド性消炎鎮痛剤</td> <td>記載省略（変更なし）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>シメチジン</td> <td>記載省略（変更なし）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フェノバルビタール</td> <td>記載省略（変更なし）</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 薬剤名等  | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | ワルファリン<br>(ワーファリン等) | 本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強され、 <u>重篤な出血をきたした症例が報告されている。患者がワルファリンの治療を必要とする場合は、ワルファリンの治療を優先し、本剤を投与しないこと。</u> | 機序不明 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 非ステロイド性消炎鎮痛剤 | 記載省略（変更なし） |  | シメチジン | 記載省略（変更なし） |  | フェノバルビタール | 記載省略（変更なし） |  | <p>3. 相互作用</p> <p>併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非ステロイド性消炎鎮痛剤</td> <td>記載省略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><del>ワルファリン</del></td> <td><del>ワルファリンの作用を増強するおそれがあるので、ワルファリンの用量を調節するなど注意すること。</del></td> <td>機序不明</td> </tr> <tr> <td>シメチジン</td> <td>記載省略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フェノバルビタール</td> <td>記載省略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 非ステロイド性消炎鎮痛剤 | 記載省略 |  | <del>ワルファリン</del> | <del>ワルファリンの作用を増強するおそれがあるので、ワルファリンの用量を調節するなど注意すること。</del> | 機序不明 | シメチジン | 記載省略 |  | フェノバルビタール | 記載省略 |  |
| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法   | 機序・危険因子   |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| ワルファリン<br>(ワーファリン等)  | 本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強され、 <u>重篤な出血をきたした症例が報告されている。患者がワルファリンの治療を必要とする場合は、ワルファリンの治療を優先し、本剤を投与しないこと。</u>   | 機序不明      |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法   | 機序・危険因子   |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| 非ステロイド性消炎鎮痛剤   | 記載省略（変更なし）  |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| シメチジン  | 記載省略（変更なし）  |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| フェノバルビタール  | 記載省略（変更なし）  |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法   | 機序・危険因子   |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| 非ステロイド性消炎鎮痛剤   | 記載省略  |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| <del>ワルファリン</del>  | <del>ワルファリンの作用を増強するおそれがあるので、ワルファリンの用量を調節するなど注意すること。</del>   | 機序不明      |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| シメチジン  | 記載省略  |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |
| フェノバルビタール  | 記載省略  |           |         |                     |   |      |      |           |         |              |            |  |       |            |  |           |            |  |  |      |           |         |              |      |  |                   |   |      |       |      |  |           |      |  |

( )部：追記、(—)部：削除（平成25年5月17日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知による改訂）

お問い合わせ先

| 販売名         | 製造販売企業                                      | 電話番号   |
|-------------|---|--|
| ケアラム錠 25mg  | エーザイ株式会社<br>お問い合わせ先：エーザイ株式会社<br>hhc ホットライン  | フリーダイヤル 0120-419-497<br>受付時間 9～18時<br>(土、日、祝日 9～17時) |
| コルベット錠 25mg | 富山化学工業株式会社<br>お問い合わせ先：大正富山医薬品株式会社<br>お客様相談室 | フリーダイヤル 0120-591-818<br>受付時間 8:30～17:00              |