

# ワンタキソテール<sup>®</sup>点滴静注20mg/1mL、80mg/4mL ご使用にあたって

本剤は従来の「タキソテール<sup>®</sup>点滴静注用20mg」、「同80mg」と「効能又は効果」、「用法及び用量」は同じですが、以下の点が異なります。


## 1 ドセタキセル濃度が2倍

ドセタキセル濃度

■ ワンタキソテール<sup>®</sup> : 20mg/mL


■ 従来のタキソテール<sup>®</sup>  
(添付溶解液に溶解後のプレミックス液) : 10mg/mL

従来のタキソテール<sup>®</sup>



抜き取り量が半量

ワンタキソテール<sup>®</sup>



⚠ **抜き取り量が、従来のタキソテール<sup>®</sup>の半量となります。  
ご使用になる製剤の薬剤濃度をご確認ください。**

本剤はドセタキセル水和物製剤で、最高用量は食道癌・子宮体癌では**70mg/m<sup>2</sup>**、その他の癌腫では**75mg/m<sup>2</sup>**です。

## 2 無水エタノール含有

本剤は**無水エタノール**を予め含有しています。

	従来のタキソテール <sup>®</sup>		ワンタキソテール <sup>®</sup>	
	20mg製剤の 添付溶解液	80mg製剤の 添付溶解液	20mg/1mL 製剤	80mg/4mL 製剤
無水エタノール重量	0.18g*1	0.72g*2	0.395g	1.58g

\*1 : 添付溶解液の95%エタノール含有量191.1mgを無水エタノールに換算した量

\*2 : 添付溶解液の95%エタノール含有量764.4mgを無水エタノールに換算した量



**本剤は無水エタノールを予め含有しています。  
アルコールに過敏な患者様には十分に  
ご注意ください。**

タキソイド系抗悪性腫瘍剤 ————— ● 薬価基準収載

**ワンタキソテール<sup>®</sup>** 20mg/1mL  
点滴静注 80mg/4mL

ドセタキセル水和物製剤 ONE TAXOTERE<sup>®</sup>

毒薬 処方せん医薬品 (注意—医師等の処方せんにより使用すること)

# ドセタキセル製剤(タキソテール®、ワンタキソテール®) 外観比較表

タキソテール®	商品名	ワンタキソテール®
<p>● 20mg製剤</p>  <p>外箱</p> <p>タキソテール® 点滴静注用バイアル (13%エタノール溶液)</p> <p>添付溶解液 (13%エタノール溶液)</p>	<p>外 観</p>	<p>● 20mg/1mL製剤</p>  <p>ワンタキソテール® 点滴静注バイアル</p> <p>外箱</p>
<p>● 80mg製剤</p>  <p>外箱</p> <p>タキソテール® 点滴静注用バイアル (13%エタノール溶液)</p> <p>添付溶解液 (13%エタノール溶液)</p>		<p>● 80mg/4mL製剤</p>  <p>ワンタキソテール® 点滴静注バイアル</p> <p>外箱</p>

●ワンタキソテール®のご使用にあたっては、ドセタキセル濃度がタキソテール®と異なること、及び無水エタノールを予め含有することにご留意ください。  
詳しくは裏面をご参照ください。