

標準用法用語集

(第2版)

平成28年1月

公益社団法人 日本薬剤師会

一般社団法人 日本病院薬剤師会

標準用法用語集（第2版）について

標準用法用語集（第2版）は平成23年9月に公益社団法人日本薬剤師会及び一般社団法人日本病院薬剤師会において作成・公開された「内服薬、外用薬に関する標準用法用語集（第1版）」の内容を、内服薬・外用薬についての用法用語の見直しを行うとともに、在宅医療の現場での利用も念頭に、注射部位や手技、施術者等についての用法用語を追加したものである。

標準用集における用法の基本的な見方は以下の通りである。

- (1) 本用語集に記載されている用法区分は内服、外用、注射、注入である
- (2) 第16局製剤通則において「経口投与する製剤、口腔内に適用する製剤」等が新たに定められたことに対応するために、内服薬は用法詳細区分として①経口投与、②舌下、③バツカル、④口腔内塗布、とした
- (3) 注射及び注入の用法詳細区分は薬剤の投与部位等を反映している
- (4) 内服薬の用法については①食事等のタイミングを基本とする用法、②時間を基本とする用法（1.2～1.4）、③口腔内で使用する用法に分類した
- (5) 頓用の用語については症状等による分類し、用語を掲載した
- (6) 外用薬については、①生活リズムを基本とする用法、②回数を基本とする用法、③時間間隔による用法等に区分した。
- (7) 外用の頓用については内服薬同様の分類を行った。
- (8) 外用で使用する部位名称について整理を行い掲載した。またこの部位は必要に応じて左、右、両方等、より細かい部位指定が可能である。
- (9) 注射・注入については時間的要素・機器で分類を行うとともに、実施環境・施行者による分類を行った。

用法詳細区分用語

	用法詳細区分	部位情報
内服	経口	不要
	舌下	不要
	バツカル(歯茎と頬の間に挟む)	不要
	口腔内塗布	不要
外用	貼付	必須
	塗布	必須
	湿布	必須
	撒布	必須
	噴霧	必須
	消毒	任意
	点耳	左・右・両
	点眼	左・右・両
	点鼻	左・右・両
	うがい	不要
	吸入	不要
	トローチ	不要
	膀胱洗浄	不要
	鼻腔内洗浄	不要
	浣腸	不要
	肛門挿入	不要
	肛門注入	不要
	腔内挿入	不要
	膀胱注入	不要
	注射	静脈注射
中心静脈注射		任意
皮下注射		任意
筋肉内注射		任意
皮内注射		任意
動脈注射		任意
硬膜外注射		任意
脳脊髄腔注射		任意
骨髄内注射		任意
関節腔内注射		任意
腱鞘内注射		任意
腱鞘周囲注射		任意
硝子体内注射		任意
結膜下注射		任意
テノン氏のう内注射		任意
耳茸内注射		任意
咽頭注射		任意
胸腔内注射		任意
痔核注射		任意
角膜内注射		任意
球後注射		任意
腹腔内注射		任意
局所・病巣内注射	任意	
注入	腹膜透析	任意
	気管内注入	任意
	涙のう内注入	任意
	鼓室内注入	任意
	滑液嚢穿刺後の注入	任意
	腹腔内注入	任意
	病巣内注入	任意

1.1 食事等のタイミングを基本とする内服用法

整理番号	1日回数	標準用法用語
1101	1回	1日1回起床時
1102		1日1回朝食前
1103		1日1回朝食直前
1141		1日1回朝食直後
1104		1日1回朝食後
1105		1日1回朝食2時間後
1106		1日1回昼食前
1107		1日1回昼食直前
1142		1日1回昼食直後
1108		1日1回昼食後
1109		1日1回昼食2時間後
1110		1日1回夕食前
1143		1日1回夕食直前
1144		1日1回夕食直後
1111		1日1回夕食後
1112		1日1回夕食2時間後
1113	1日1回就寝前	
1114	1日1回空腹時	
1115	2回	1日2回朝食前と就寝前
1116		1日2回朝食後と就寝前
1117		1日2回朝昼食前
1145		1日2回朝昼食直前
1118		1日2回朝昼食後
1119		1日2回朝夕食前
1146		1日2回朝夕食直前
1147		1日2回朝夕食直後
1120		1日2回朝夕食後
1121		1日2回朝夕食事2時間後
1122		1日2回昼夕食前
1148		1日2回昼夕食直前
1123		1日2回昼食前と就寝前
1124	1日2回昼夕食後	
1125	1日2回昼食後と就寝前	
1126	1日2回夕食前と就寝前	
1127	1日2回夕食後と就寝前	
1128	3回	1日3回朝昼夕食前
1129		1日3回朝昼夕食直前
1149		1日3回朝昼夕食直後
1130		1日3回朝昼夕食後
1131		1日3回朝昼夕食後2時間
1132		1日3回朝昼食前と就寝前
1133		1日3回朝昼食後と就寝前
1134		1日3回朝夕食前と就寝前
1135		1日3回朝夕食後と就寝前
1136		1日3回昼夕食前と就寝前
1137	1日3回昼夕食後と就寝前	
1138	4回	1日4回朝昼夕食前と就寝前
1139		1日4回朝昼夕食後と就寝前
1140	5回	1日5回朝昼夕食後、15時、就寝前

1.2 1日回数と時間間隔を明示した内服用法

整理番号	標準用法用語
1201	1日2回 12時間毎
1202	1日3回 8時間毎
1203	1日4回 6時間毎
1204	1日6回 4時間毎
1205	1日8回 3時間毎

1.3 1日回数と服用時刻を明示した内服用法(時刻指定型Ⅰ)

整理番号	標準用法用語
1301	1日1回 N1時
1302	1日2回 N1時, N2時
1303	1日3回 N1時, N2時, N3時
1304	1日4回 N1時, N2時, N3時, N4時
1305	1日5回 N1時, N2時, N3時, N4時, N5時
1306	1日6回 N1時, N2時, N3時, N4時, N5時, N6時
1307	1日8回 N1時, N2時, N3時, N4時, N5時, N6

1.4 1日回数とイベントを明示した内服用法(時刻指定型Ⅱ)

整理番号	標準用法用語
1401	1日1回 哺乳時
1402	1日2回 哺乳時
1403	1日3回 哺乳時
1404	1日4回 哺乳時
1405	1日5回 哺乳時
1406	1日6回 哺乳時
1407	1日8回 哺乳時
1408	1日10回 哺乳時
1409	1日12回 哺乳時

1.5 口腔内で使用する内服薬の用法

整理番号	標準用法用語
1501	舌下で使用
1502	歯茎と頬の間に挟んで使用(飲んだり噛んだりしない)
1503	塗布

1. 6 頓用型の内服用法

整理番号	区分	標準用法用語
1601	痛み	疼痛時
1602		頭痛時
1603		歯痛時
1604		胸痛時
1605		腹痛時
1606		腰痛時
1607		関節痛時
1608	呼吸	喘鳴時
1609		喘息発作時
1610		喉がゴロゴロする時
1611		しゃっくり時
1612		咳込時
1613	循環器	血圧上昇時〇〇mHg以上（注2）
1614		血糖値〇〇mg/dL以上（注2）
1615	消化器	便秘時
1616		お腹がゴロゴロする時
1617		下痢時
1618		嘔吐時
1619		吐き気時
1620		空腹時
1621		出血時
1622	腎	乏尿時〇〇mL/時間未満（注2）
1623		多尿時
1624		むくみ時
1625	精神神経	不眠時
1626		不安時
1627		不穏時
1628		いらいら時
1629		けいれん時
1630		めまい時
1631		疲労時
1632	熱	発熱時(〇〇度以上)（注2）
1633		悪寒時
1634	皮膚	かゆい時
1635		発疹時
1636	その他の症状	発作時
1637		症状ある時
1638	医療	検査前
1639		検査時
1640		検査後
1641		手術前
1642		手術後
1643		処置前
1644		処置時
1645		処置後
1646		生活
1647	入浴前	
1648	食事前	
1649	食事後	
1650	就寝前	
1651	外出時	
1652	哺乳時	
1653	その他	必要時
1654		適宜

2.1 生活リズムを基本とする外用用法

整理番号	1日回数	標準用法用語
2101	1回	1日1回起床時
2102		1日1回朝
2103		1日1回昼
2104		1日1回夕
2105		1日1回就寝時
2106	2回	1日2回朝夕
2107		1日2回朝と就寝前
2108		1日2回午前と午後
2109	3回	1日3回朝昼夕
2110	4回	1日4回朝昼夕と就寝前

2.2 1日回数だけを明示した外用用法

整理番号	標準用法用語
2201	1日1回
2202	1日2回
2203	1日3回
2204	1日4回
2205	1日6回
2206	1日3回程度
2207	1日4回程度
2208	1日6回程度
2209	1日1～2回
2210	1日1～数回
2211	1日2～3回
2212	1日3～4回
2213	1日4～5回

2.3 時間間隔で明示した外用用法(時間指定型Ⅰ)

整理番号	標準用法用語
2301	2～3時間毎
2302	4～6時間毎

2.4 頓用型の外用用法

整理番号	区分	標準用法記述
2401	痛み	疼痛時
2402		頭痛時
2403		歯痛時
2404		胸痛時
2405		腹痛時
2406		腰痛時
2407		関節痛時
2408	呼吸	喘鳴時
2409		喘息発作時
2410		喉がゴロゴロする時
2411		しゃっくり時
2412		咳込時
2413	循環器	血圧上昇時〇〇mHg以上（注2）
2414		血糖値〇〇mg/dL以上（注2）
2415	消化器	便秘時
2416		お腹がゴロゴロする時
2417		下痢時
2418		排便時
2419		嘔吐時
2420		口腔乾燥時
2421		吐き気時
2422		空腹時
2423		出血時
2424	腎	乏尿時〇〇mL/時間未満（注2）
2425		多尿時
2426		むくみ時
2427	精神神経	不眠時
2428		不安時
2429		不穏時
2430		いらいら時
2431		けいれん時
2432		めまい時
2433		疲労時
2434	熱	発熱時(〇〇度以上)（注2）
2435		悪寒時
2436	皮膚	かゆい時
2437		発疹時
2438	その他の症状	発作時
2439		症状ある時
2440	医療	検査前
2441		検査時
2442		検査後
2443		手術前
2444		手術後
2445		処置前
2446		処置時
2447		処置後
2448	生活	起床時
2449		入浴前
2450		食事前
2451		食事後
2452		就寝前
2453		外出時
2454		哺乳時
2455	その他	必要時
2456		適宜

3 外用用法で使用する部位名称の標準用語

部位名称	
全身	手の指の間
頭皮	手の爪
頭部	手足
頭頂部	体幹部
後頭部	背中
ひたい	上背部
顔	脇の下
まゆ	全胸部
まゆのまわり	乳房
まぶた	乳房まわり
眼	乳首
目のまわり	上腹部
頬	下腹部
鼻	へそ
鼻のまわり	へそのまわり
鼻の下	臀部
鼻腔内	陰のう
耳	陰部
耳たぶ	股間部
耳のうしろ	肛門部
耳のまわり	肛門周囲
耳の中	下肢
口	ふともも
口のまわり	ふともも後ろ
口唇	ふとももとすね
口腔内	膝
口腔内ほほの内側	膝のうら
口腔内上あご部	すね
上歯茎部	ふくらはぎ
下歯茎部	くるぶし
舌	かかと
舌の裏側	足
喉の奥	足の裏
扁桃腺部	足の甲
下あご	足のゆび
首	足のゆびの間
うなじ	足の爪
肩	かゆい所
上肢	カサカサした所
腕	じくじくした所
上腕	ひどい所
前腕	褥瘡部
ひじ	発赤部
手	発疹部
手の甲	ストマ部
手のひら	カテ挿入部
手の指	患部

3.1 注射・注入用法における時間的要素・機器

整理番号	標準用法用語
3001	ワンショット
3002	点滴
3003	持続投与
3004	持続投与(輸液ポンプ使用)
3005	精密持続投与(シリンジポンプ使用)

4.1 注射・注入用法における実施環境・施行者

整理番号	標準用法用語
4001	医療機関・医療従事者
4002	医療機関・自己
4003	在宅・医療従事者
4004	在宅・自己